

국소마취제  
엘엠엑스4 크림  
(리도카인 4%)



8 806273 000202

일반의약품 분류번호: 01210

※ 이 약을 사용하시기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 약과 함께 보관하십시오.

[원료의약품 및 분량] 1g 중

- \* 유효성분 : 리도카인 (USP) ..... 40mg  
\* 보존제 : 벤질알코올(NF) ..... 15mg  
\* 기타첨가제 : 정제수, 카르보머940, 콜레스테롤, 포스포리핀80H, 폴리소르베이트80,  
프로필렌글리콜, 트롤아민, 초산토코페롤

[성상] 백색의 황색빛이 도는 크림

[효능 · 효과] 다음 경우에서의 통증의 일시적 경감: 자상, 찰과상, 경증의 화상, 피부자극, 벌레물림

[용법 · 용량] 증상에 따라 적당량 도포한다.

1일 최대 투여용량은 25g(리도카인으로서 1,000mg)을 초과하지 않는다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것

- 1) 이 약 또는 기타의 아미드계 국소마취제에 과민증 환자 2) 병소에 2차 감염 환자

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.  
2) 이 약은 모유로 이행되나 치료용량으로는 영아에 대한 위험성은 없는 것으로 보인다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 적용 부위에 점막의 외상 또는 패혈증 환자  
2) 간질 환자  
3) 심장 전도 이상, 서맥, 간기능 손상, 중증의 속 흐르는 4) 이 약과 부정맥용제(예: 토키아닌드)를 병용투여하는 경우, 부작용이 증강될 수 있으므로 주의한다. 5) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것:

- 1) 속: 속이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 혈압저하, 안면창백, 맥박의 이상, 호흡억제 등이 나타나는 경우에는 즉시 투여중지하고 적절한 처치를 한다.  
2) 중추신경계 ① 진전, 경련 등의 중독한 증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 즉시 투여중지하고 디아제팜 또는 초단시간형 바르비탈산 제제(치오펜탈나트륨) 투여 등 적절한 처치를 한다. ② 졸음, 어지러움, 신경과민, 의식소실 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하여 속 또는 중독한 증상으로 이행하는 것에 주의하고 필요에 따라 적절한 처치를 한다.

3) 저혈압, 심근억제, 서맥, 심정지 등의 심장 억제 작용이 나타날 수 있다.

4) 자극감 등 과민증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

5. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 경증의 병소에만 사용한다.
- 2) 장기간 사용하지 않는다.
- 3) 안과용으로 사용하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 기밀용기, 15~30°C에서 보관한다.
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

[저장방법] 기밀용기, 15~30°C 보관

[포장단위] 5g / 퓨브

[사용기한] 포장 참조

- 의약품을 본래의 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 관한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로, 본래의 용기에 넣고 꼭 닫아보관할 것.
- 의약품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 공정거래고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- 의약품 정보 및 이 첨부문서 작성일 이후 변경된 내용은 온라인의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) 및 자사홈페이지 (<http://www.glrubicon.co.kr>), 또는 소비자상담실(031-382-7694)에서 확인하실 수 있습니다.
- 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품 안전관리원 (1644-6223)

문서작성(개정)년월일 : 2021.10.13

[제조원] Ferndale Laboratories Inc.

780 West Eight Mile Rd, Ferndale, MI 48220, USA

[수입판매원] 지엘루비콘(주)

경기도 안양시 동안구 평촌대로 386, 3층  
(비산동)